

# O seu cão coça-se muito?

Descubra mais informações sobre a  
**dermatite alérgica/atópica** em cães



## > Porque é que o meu cão tem tanta comichão?

Se o seu cão se coça com frequência, pode estar a sofrer de prurido alérgico, mais conhecido como comichão, um problema generalizado entre os cães.

Existem quatro formas comuns de prurido alérgico:<sup>1,2</sup>

- ✔ **Dermatite atópica canina (DAC)**, causada por alérgenos ambientais como o pólen ou os ácaros do pó doméstico.
- ✔ **Alergia a parasitas**, como as pulgas.
- ✔ **Alergias alimentares**, muitas vezes a fontes específicas de proteína na comida do seu cão, como o frango.
- ✔ **Alergias de contacto**, relacionadas com substâncias químicas, por exemplo, no solo ou nos brinquedos do seu cão.


Dependendo do alérgeno, o seu cão pode ter comichão durante todo o ano ou apenas durante certas épocas.

## > O que é a dermatite atópica canina (DAC)?

**A DAC é uma das causas mais comuns de prurido alérgico.** É uma condição vitalícia que frequentemente se desenvolve durante os primeiros anos de vida do seu cão. Inicialmente, a pele pode parecer normal, mas coçar, lambe, morder e esfregar continuamente causam perda de pelo e danos na pele, o que pode levar a infeções secundárias por bactérias ou fungos.

Embora não exista uma cura real para a DAC, esta pode ser **mantida sob controlo** com um tratamento adequado.<sup>2,3</sup>

## > Áreas mais afetadas na DAC<sup>4</sup>



## > Como é que o meu cão é tratado?

O seu médico veterinário irá estabelecer consigo um **plano terapêutico personalizado** para o seu cão com comichão, que o ajudará a melhorar a sua qualidade de vida.

O tratamento da DAC é geralmente multimodal e pode envolver várias medidas concomitantes, tais como:

- Uso de champôs especiais
- Tratamento antiparasitário
- Tratamento anti-infeccioso
- Dieta específica e/ou suplementos
- Uso de moléculas imunomoduladoras para controlar comichão e inflamação

Dependendo da melhoria do seu cão, **o seu médico veterinário ajustará o plano conforme necessário.**<sup>2,5</sup>



## > Controle o nível de prurido do seu cão

Utilize a seguinte escala para medir o nível de prurido do seu cão ao longo do tempo<sup>6,7</sup>. Ajudará o seu médico veterinário a monitorizar o tratamento estabelecido e a adaptá-lo, se necessário.

- 10 Prurido extremo**  
Prurido extremo/contínuo. O meu cão não para de se coçar, independentemente do ambiente envolvente ou de comandos, e precisa de ser fisicamente restringido.
- 8-9 Prurido grave**  
O prurido interrompe o sono, a alimentação, a brincadeira e o exercício do meu cão. O prurido continua mesmo quando o meu cão está distraído.
- 6-7 Prurido moderado**  
O meu cão tem comichão periodicamente o longo do dia, mas não quando come, brinca, faz exercício ou está distraído. O prurido observado ocorre à noite.
- 4-5 Prurido leve**  
O meu cão não tem comichão quando come, brinca, faz exercício ou está distraído.
- 2-3 Prurido muito leve**  
O meu cão só tem um pouco mais de comichão do que eu considero normal.
- 0-1 Cão normal**  
O prurido não é um problema para o meu cão.

INTENSIDADE DO PRURIDO		DIA									
		1	2	3	4	5	6	7	14	21	28
Extremo	10										
Grave	8-9										
Moderado	6-7										
Leve	4-5										
Muito Leve	2-3										
Normal	0-1										

Lembre-se sempre de consultar o seu médico veterinário para obter aconselhamento específico sobre a saúde do seu animal de estimação.

Ref: 1. Olivry T, Préloud P, Héripret D, et al. Allergic contact dermatitis in the dog. Principles and diagnosis. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 1990 Nov;20(6):1443-56. 2. Miller J, Simpson A, Bloom P, et al. 2023 AAHA Management of Allergic Skin Diseases in Dogs and Cats Guidelines. J Am Anim Hosp Assoc. 2023 Nov 1;59(6):255-284. 3. Olivry T, DeBoer DJ, Favrot C, et al. Treatment of canine atopic dermatitis: 2010 clinical practice guidelines from the International Task Force on Canine Atopic Dermatitis. Vet Dermatol. 2010 Jun;21(3):233-48. 4. Olivry T, Saridomichelakis M, Nuttall T, et al. Validation of the Canine Atopic Dermatitis Extent and Severity Index (CADESI)-4, a simplified severity scale for assessing skin lesions of atopic dermatitis in dogs. Vet Dermatol. 2014 Apr;25(2):77-85, e25. 5. Olivry T, DeBoer DJ, Favrot C, et al. Treatment of canine atopic dermatitis: 2015 updated guidelines from the International Committee on Allergic Diseases of Animals (ICADA). BMC Vet Res. 2015 Aug 16;11:210. 6. Hill P.B. et al. Vet Dermatol. 2007;18(5):301-308. 7. Rybníček J, et al. Vet Dermatol. 2009;20(2):115-122.

Elanco e a barra diagonal são marcas registadas da Elanco ou das suas filiais. ©2025 Elanco Animal Health, Inc. ou das suas filiais. PM-PT-25-0185

**Elanco**